

# Concours de l'Association mathématique du Québec 2012

## Ordre collégial

AUX CANDIDATES, AUX CANDIDATS


*Ceci n'est pas un examen, mais bien un concours ; il est donc tout naturel que vous trouviez certaines questions difficiles et que vous ne puissiez répondre qu'à quelques-unes. La correction, strictement confidentielle, prendra en compte divers éléments, dont la démarche, la précision, la clarté, la rigueur et l'originalité, de même que les esquisses de réponses dans le cas d'une solution non complétée.*

*Nous vous remercions et vous félicitons de votre intérêt pour les mathématiques. Bonne chance.*

**Note :** *L'usage de toute forme de calculatrice est interdit.*

### 1. Redorer son enseigne

Une compagnie veut se créer un nouveau logo très rutilant pour remplacer sa vieille enseigne extérieure. Celui-ci sera formé d'un rectangle d'or de 1 mètre par  $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$  mètre inscrit dans un cercle. De plus, chaque côté du rectangle sera le diamètre d'un demi-cercle qui sera rajouté au logo tel qu'illustré dans la figure. La compagnie veut plaquer le rectangle et les lunules (la partie ombragée) de son logo d'une mince couche d'or 24 carats. Sachant que l'or en feuilles minces de 24 carats se vend 0,05 \$ le centimètre carré, combien en coûtera-t-il à la compagnie pour redorer son enseigne ?



*Solution :*

En séparant la figure en deux avec une diagonale du rectangle, on obtient un triangle rectangle inscrit dans un demi-cercle. Notons par  $a$ ,  $b$  et  $c$  les côtés de ce triangle. L'aire des deux lunules associées sera égale à l'aire des deux demi-cercles ayant pour diamètres les côtés du rectangle moins la différence entre l'aire du triangle rectangle et celle du demi-cercle dans lequel il est inscrit.

L'aire d'un demi-cercle en fonction du diamètre est donnée par  $\frac{\pi}{8} \cdot d^2$  ; on a donc que l'aire des deux lunules vaudra :

$$\frac{\pi}{8} \cdot a^2 + \frac{\pi}{8} \cdot b^2 - \left[ \frac{\pi}{8} \cdot c^2 - \frac{1}{2} \cdot a \cdot b \right] = \frac{\pi}{8} \cdot [a^2 + b^2 - c^2] + \frac{1}{2} \cdot ab.$$

Le triangle étant rectangle, l'expression contenue à l'intérieur des derniers crochets vaudra 0 (Pythagore) et l'aire des deux lunules est ainsi égale à  $\frac{1}{2} \cdot ab$ , soit  $\frac{1+\sqrt{5}}{4}$ .

On réalise alors que cette aire est la même que celle du triangle rectangle, donc celle des quatre lunules est identique à celle du rectangle d'or, soit  $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ , ce qui donne  $1 + \sqrt{5}$  pour la partie ombragée du logo.

Le coût sera donc de  $(1 + \sqrt{5}) \cdot 0,05 \cdot 10000 = 500(1 + \sqrt{5}) \approx 1618\$$ .

## 2. La puce à remonter le temps

À minuit, une puce sur une horloge se situe dos à l'aiguille des heures et commence à courir à vitesse constante dans le sens inverse des aiguilles. À 8h, la puce diminue sa vitesse du quart, à 16h elle diminue encore sa vitesse, cette fois-ci du tiers. Exactement 24 heures après le début de sa course, la puce croise pour une 2012<sup>e</sup> fois l'aiguille des heures. À quelle position sur l'horloge était la puce à 10h du matin ? Dire sur quel numéro de l'horloge se trouve la puce ou donner la fraction du chemin qu'il lui reste à parcourir entre deux numéros consécutifs.

*Solution :*

Posons  $v$ , la vitesse en tours/heure de la puce pendant les 8 premières heures.

Ensuite elle va à une vitesse de  $\frac{3}{4}v$ .

À 16 h, elle diminue à nouveau sa vitesse du tiers qui devient alors  $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3}v = \frac{1}{2}v$ .

La puce et l'aiguille se croisent à chaque fois que la somme de leur distance parcourue donne un tour.

La distance totale parcourue par la puce est  $8v + 8 \cdot \frac{3}{4}v + 8 \cdot \frac{1}{2}v = 18v$ .

La distance totale parcourue par l'aiguille est  $24 \cdot \frac{1}{12} = 2$  tours.

La somme de ces deux distances donne donc le nombre total de croisements.

À partir de ce nombre, on peut isoler la vitesse initiale de la puce.

$18v + 2 = 2012$ , donc  $v = \frac{335}{3}$  tours/heure = 111 et  $\frac{2}{3}$  tours/heure.

Après 8 heures, la puce a fait  $8 \cdot \frac{335}{3} = 893$  tours et  $\frac{1}{3}$  de tour.

Donc elle est sur le 8 (elle va dans le sens inverse des aiguilles :  $12 - \frac{12}{3} = 8$ ).

Pendant les deux prochaines heures, elle fait  $2 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{335}{3}$  tours =  $\frac{335}{2}$  tours, donc 167 tours complets et un demi-tour.

Elle est donc sur la position du numéro 2 ( $8 - \frac{12}{2}$ ).

### 3. Une question de concours... de circonstance

On vous demande de préparer une question pour un concours de mathématiques qui utilise la date du concours, soit le 9/2/12. Vous décidez d'employer une fraction continue où le jour et le mois seraient répétés de la façon suivante :

$$n = 9 + \frac{x}{2 + \frac{x}{9 + \frac{x}{2 + \frac{x}{9 + \dots}}}}$$

Quelle valeur de  $x$  devez-vous utiliser pour que le résultat  $n$  corresponde au nombre 12 de l'année ?

*Solution :*

Comme la même fraction est répétée à l'infini, on peut établir les relations suivantes :

$$n = 9 + \frac{x}{2 + \frac{x}{n}}$$

$$n = 9 + \frac{x}{\frac{2n+x}{n}}$$

$$n = 9 + \frac{nx}{2n+x}$$

$$n = \frac{18n+9x+nx}{2n+x}$$

$$2n^2 + nx = 18n + 9x + nx$$

$$2n^2 - 18n = 9x$$

$$x = \frac{2n(n-9)}{9}$$

Et en posant  $n = 12$  on trouve  $x = 8$ .

N.B. Évidemment, on aurait pu poser initialement que  $n = 12$  ...

mais ce n'est pas la façon dont on construit une question de concours !

#### 4. Les racines d'Olivier

Olivier s'amuse à trouver des polynômes  $p(x)$ , toujours à coefficients entiers, dont les racines (les zéros) sont des racines comme  $\sqrt{2}$  ou  $\sqrt{3}$ . Facile!

Question d'augmenter son défi, il décide ensuite d'en trouver un dont  $\sqrt{2} + \sqrt{3}$  serait une racine (c'est-à-dire que  $p(\sqrt{2} + \sqrt{3}) = 0$ ). Il finit par en obtenir un qui, à sa grande surprise, est relativement simple. Trouver quel est ce polynôme à coefficients entiers.

*Solution :*

Pour que  $\sqrt{2} + \sqrt{3}$  soit le zéro d'un polynôme, il faut que :

$$\begin{aligned}x - (\sqrt{2} + \sqrt{3}) &= 0 \\ \Rightarrow x &= \sqrt{2} + \sqrt{3} \\ \Rightarrow x^2 &= (\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 \\ \Rightarrow x^2 &= 2 + 2\sqrt{6} + 3 \\ \Rightarrow x^2 - 5 &= 2\sqrt{6} \\ \Rightarrow (x^2 - 5)^2 &= 24 \\ \Rightarrow x^4 - 10x^2 + 25 &= 24 \\ \Rightarrow x^4 - 10x^2 + 1 &= 0\end{aligned}$$


Donc,  $p(x) = x^4 - 10x^2 + 1$  est un polynôme à coefficients entiers répondant au critère.

(ou tout multiple de ce polynôme)

#### 5. Avoir plusieurs cordes à son arc... de cercle

Soit un cercle et un point  $P$  qui lui est extérieur. À partir de  $P$  on trace des droites qui, en traversant le cercle, définissent des cordes du cercle. Montrer que tous les points milieu de ces cordes sont situés sur un même cercle.

*Solution :*



Soit  $O$  le centre du cercle,  $A$  et  $B$  les points extrêmes d'une corde et  $M$  le point milieu de cette corde.

Le triangle  $AOB$  est isocèle car formé de deux rayons du cercle.

Donc sa médiane  $OM$  est confondue avec la hauteur issue de  $O$ , ce qui veut dire que  $OM$  est perpendiculaire à  $AB$ .

Le triangle  $OMP$  est donc toujours rectangle.

Donc le triangle  $OMP$  est toujours inscritible dans un demi-cercle de diamètre  $OP$ .

Conclusion : Le point  $M$  fera toujours partie du cercle de diamètre  $OP$ .

## 6. Les dés doublés

Jacques s'amuse avec de drôles de dés dont les faces opposées montrent un même chiffre : 1, 2 ou 3. Chacun de ces trois résultats est donc équiprobable. Il s'invente un jeu dont le but est d'obtenir le chiffre 3. Il commence par lancer un seul dé. Tant qu'il n'obtient aucun 3, il fait un nouveau lancer, mais lance cette fois un nombre de dés égal au plus grand chiffre obtenu lors du lancer précédent. En moyenne, combien de lancers seront nécessaires avant d'obtenir un 3 ?

*Solution :*

On pose que  $n_i$  est le nombre moyen de lancers nécessaires pour obtenir 3 si on commence par lancer  $i$  dés. Comme on lance toujours 1 ou 2 dés (jamais 3), nos seules variables sont  $n_1$  et  $n_2$ .

Quand on lance un seul dé :

Valeur du plus grand dé	Probabilité
1	$\frac{1}{3}$
2	$\frac{1}{3}$
3	$\frac{1}{3}$

On effectue un lancer. On a la même chance d'obtenir 1, 2 ou 3. Si on obtient 1, on a effectué 1 lancer et on doit continuer le jeu en lançant 1 dé, ce qui nous demandera en moyenne  $n_1$  lancers supplémentaires avant de rouler un 3. Si on obtient plutôt un 2, on a aussi effectué un lancer et on doit continuer le jeu en lançant 2 dés, ce qui nous demandera en moyenne  $n_2$  lancers supplémentaires. Si on obtient 3, c'est le dernier lancer qu'on aura à faire.

Pour obtenir le nombre moyen de lancers nécessaires, on multiplie chacun des résultats par sa probabilité associée et on en fait la somme :

$$\begin{aligned}
n_1 &= (1 + n_1) \cdot \frac{1}{3} + (1 + n_2) \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{1}{3} \\
\Rightarrow n_1 &= 1 + \frac{1}{3}n_1 + \frac{1}{3}n_2 \\
\Rightarrow 2n_1 - n_2 &= 3 \qquad (1)
\end{aligned}$$

Quand on lance deux dés :

Valeur du plus grand dé	Probabilité	
1	$\left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$	(il faut avoir 1 et 1)
3	$1 - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{5}{9}$	(1 - la probabilité de n'avoir jamais 3)
2	$1 - \left(\frac{1}{9} + \frac{5}{9}\right) = \frac{1}{3}$	(probabilité complémentaire)

Par la même logique que lorsqu'on lance un dé, on obtient :

$$\begin{aligned}
n_2 &= (1 + n_1) \cdot \frac{1}{9} + (1 + n_2) \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{5}{9} \\
\Rightarrow n_2 &= 1 + \frac{1}{9}n_1 + \frac{1}{3}n_2 \\
\Rightarrow -n_1 + 6n_2 &= 9 \qquad (2)
\end{aligned}$$

On a un système de 2 équations à 2 inconnues qui donne comme solution  $n_1 = \frac{27}{11}$ .

## Liste des résultats au concours AMQ collégial 2012

Faute de place, nous ne publions ici que les 39 meilleurs résultats sur les 159 candidats présents.

Rang	Nom	Prénom	Institution
1	Wang	Jiajun	Vanier College
2	Liu	Yu Yang	Marianopolis College
3	Sadikov	Igor	Marianopolis College
4	Fauteux-Chapleau	François-Simon	Cégep de Lanaudière à Joliette
4	Nassif	Mathieu	Collège Jean-de-Brébeuf
6	Savadjiev	Gueorgui	Marianopolis College
7	Lagacé	Jean	Cégep Saint-Laurent
8	Cai	Xue Si	Marianopolis College
8	Dumont	Félix	Collège de Maisonneuve
10	Li	Sida	Marianopolis College
11	Tourangeau	Sarah-Jeanne	Collège de Bois-de-Boulogne
12	Alachi	Joseph	Marianopolis College
13	Fontaine	Simon	Collège de Maisonneuve
13	Shan	Yu Qing (Anne)	Marianopolis College
13	Zhou	Yu Ge	Marianopolis College
16	Zhang	Xiaowei	Champlain-St-Lawrence College
17	Horhoge	Vlad	Marianopolis College
18	Bokser	Rory	Dawson College
18	Chan	Wesley	Marianopolis College
18	Jessup	Sébastien	Champlain-St-Lambert College
18	Lantagne-Hurtubise	Étienne	Collège de Bois-de-Boulogne
18	Mengxuan	Xia	Vanier College
18	Zhou	Mingsha	Marianopolis College
24	Luc	Caroline	Marianopolis College
24	Shahbazilar	Shayan	Vanier College
24	Telemishev	Alan	Marianopolis College
27	Bader	Victor	Cégep de Saint-Jérôme
27	Han	Xu	Marianopolis College
27	Lavoie	Michel	Cégep de Granby Haute-Yamaska
30	Beaudin	Marie	Champlain-St-Lawrence College
30	Chen	Jianqiu	Marianopolis College
30	Drolet	Charles	Cégep de Sherbrooke
30	Dubé	Félix	Collège de Bois-de-Boulogne
30	Girard	Vincent	Cégep de Limoilou
35	Brin-Marquis	Samuel	Cégep de Baie-Comeau
35	Galbraith	Nicholas	Dawson College
37	Gaboriaud	Julien	Collège de Maisonneuve
37	Jiaqi	Zhu	Dawson College
37	Yin	Xi Yuan	Marianopolis College